УДК 636.085.16: 582.931.4

DOI: 10.25684/0513-1634-2023-147-49-56

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ *OLEA EUROPAEA* L.

Оксана Геннадьевна Белоус¹, Александра Владимировна Паштецкая²,
Наталья Борисовна Платонова¹

¹Федеральный исследовательский центр

«Субтропический научный центр Российской академии наук»

354002, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28

² Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН

298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск, 52

E-mail: oksana191962@mail.ru¹, oksana_shevchuk1970@mail.ru²

Спектрофотометрически определен компонентный состав ряда биологически активных веществ в листьях *Olea europaea* L., произрастающих в коллекции Никитского ботанического сада. Суммарное содержание полифенолов в среднем составляет 538,94 мг/100 г сухой массы. Основными флавоноидами листьев являются антоцианидины, флаваноны (197,1 мг/100 г) и флаванолы (299,7 мг/100 г). Из антоцианидинов наиболее представлены пеларгонидины (184,0 мг/100 г) и цианидины (160,1 мг/100 г), содержание остальных антоцианов на одном уровне – в среднем 18% от суммы всех антоцианов. Количество фотосинтетических пигментов составляет 0,43±0,02 мг/г (хлорофилл *b*), 1,32±0,07 мг/г (хлорофилл *a*) и 0,40±0,02 мг/г (сумма каротиноидов). Содержание антоцианидинов отрицательно коррелирует с количеством хлорофиллов и каротиноидов. Анализ и идентификация биологически активных веществ в листьях *Olea europaea* продолжатся, что позволит оценить фармакологическую значимость данной культуры в условиях ЮБК.

Ключевые слова: *Olea europaea* L.; маслина; листья; биологически активные вещества; флавоноиды; антоцианы; каротиноиды

Введение

В последнее время все большую актуальность приобретают исследования химического состава растительного сырья. Цель подобных исследований связана, во-первых, с определением пищевкусового значения тех или иных растений, во-вторых, с оценкой возможности использования растительного сырья в качестве источника ценных для человека антиоксидантов. В этом отношении большой интерес представляют субтропические растения, содержащие комплекс биологически активных веществ различной природы: витаминов, полифенолов, алкалоидов и т.д. Особую ценность представляет культура *Olea europaea* L. (олива, маслина), химический состав которой достаточно богат биологически активными веществами, в том числе, насыщенными и ненасыщенными жирными кислотами, жирорастворимыми витаминами А, Е, К и водорастворимыми витаминами группы В, глицеридами и др. [17, 20].

Однако, основные исследования в отношении химического состава оливы касаются плодов и, получаемого из них, оливкового масла, в то время как листья как правило не рассматриваются. В то же время, известно, что листья оливы, являющиеся побочным продуктом при сборе плодов и обрезке, обладают большим биологическим потенциалом [7].

Известно, что листья *Olea europaea* содержат большой спектр фенольных соединений, более того, их количество превышает накопление данных веществ в плодах и оливковом масле, а также, превосходит содержание фенольных компонентов в листьях *Camellia sinensis* L. [5, 6, 14, 23]. Основными фенольными компонентами листьев оливы являются секоиридоиды, флавоноиды и простые фенолы, такие как олеуропеин,

лютеолин, лютеолин-7-О-глюкозид и гидрокситирозол [7, 12, 16, 19-22]. Исследования ученых из Крымского федерального университета позволили обнаружить в листьях и плодах оливы вещества, участвующие в ингибировании раковых клеток [4], также зарубежными исследованиями подтверждается антипролиферативное действие веществ, входящих в состав листьев, что может способствовать повышению эффективности лечения злокачественных опухолей, поддерживая нормальное восстановление ДНК [7].

В данной связи изучение химического состава листьев оливы, произрастающей в условиях ЮБК, и выявление особенностей накопления в них БАВ достаточно перспективная, актуальная задача.

Объекты и методы исследования

Листья были собраны с маслины европейской (*Olea europaeae* L.) сорта 'Никитская' (*Nichitskaia*) (рис. 1 А) селекции Никитским ботаническим садом [10].

Листья сравнительно небольшие, длиной 4,9, шириной 1,1 см, заостренно-ланцетовидные, наибольшая ширина ближе к вершине, сверху темно-зеленые, кожистые; расположение супротивное [11].

Сбор материала для исследований проводился в период сбора плодов маслины (вторая декада октября). Растения выращиваются на территории Никитского ботанического сада в условиях сухого субтропического климата средиземноморского типа Южного берега Крыма. Сушка листьев проводилась при комнатной температуре (рис. 1 Б).

А

Б

Рис. 1 Маслина сорта 'Никитская' (А), лист маслины сорта 'Никитская' (Б)

Изучение содержания биологически активных веществ проводили на базе отдела физиологии и биохимии растений ФИЦ ШЦ РАН (Сочи, Россия). Определяли полярные соединения (полифенолы, флавоноиды, антоцианы) и неполярные (каротиноиды и хлорофиллы). Все определения проводили спектрофотометрически на спектрофотометре ПЭ-5400ви (Россия).

Суммарное содержание полифенолов определяли спектрофотометрическим методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу в качестве группового реагента [3]. Метод основан на образовании вольфрамовой сини, которая имеет полосу поглощения с максимумом 765 нм.

Содержание хлорофилла и каротиноидов определяли методом Шлыка [9] по спектрам поглощения (длины волн для хлорофилла а – 662 нм, хлорофилла b – 644 нм, суммы каротиноидов – 440,5 нм) с использованием расчетных формул Смита и Бенитеза (при экстрагировании 96%-м этанолом).

Сумму флавоноидов оценивали в водно-спиртовом экстракте из сухих листьев спектрофотометрически в диапазоне длин волн коротковолновых максимумов в пересчете содержания флавоноидов на рутин [8].

Количество и состав антоцианов – в 1%-ном солянокислом водном экстракте, для внесения поправок на содержание зеленых пигментов определяли оптическую плотность полученных экстрактов при длине волны 657 нм. Содержание антоцианов рассчитывали по цианидин-3,5-дигликозиду и выражали в мг/г сухого веса [8].

Все эксперименты проводились в трехкратной повторности, результаты выражены в виде среднего $\pm$ стандартного отклонения. Статистический анализ результатов исследований проведен с применением пакета статистических программ STATGRAPHICS Centurion XV и математического пакета программ MS Excel с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Отличия при $p < 0.05$ считались статистически значимыми.

Результаты и обсуждение

Olea europaea L. (олива европейская, маслина) – субтропическое вечнозеленое дерево – относится к роду *Olea* (Маслина) семейства Oleaceae (Маслиновые); интродуцент из юго-восточного Средиземноморья. Растения с древности возделываются в основном для получения оливкового масла. Листья оливы простые, почти сидячие, кожистые, узколанцетные, цельнокрайние, серо-зелёные, снизу серебристые. Как упоминалось ранее, листья являются побочным продуктом, получаемым при сборе урожая или обрезке. В последнее время сухие листья оливы стали использовать в качестве витаминизированного, биологически активного сырья для приготовления настоев, в косметологии, фармакологии и пр.

Полифенолы являются достаточно распространёнными биологически активными соединениями, содержащимися в растительных объектах. Полифенолы подразделяются на группы в зависимости от строения молекулы – фенольные кислоты, стильбены, флавоноиды, лигнаны. Наиболее богаты полифенолами субтропические культуры. Нами показано, что суммарное количество полифенолов в экстракте листьев оливы составляет в среднем $538,94 \pm 80,7$ мг/100 г сухой массы [21].

Среди полифенолов наиболее многочисленной группой являются флавоноиды, которые представляют интерес с позиции их антиоксидантной активности и участия в качестве компонентов, предотвращающих или тормозящих образование опухолей, укрепляющих кровеносные сосуды, являющихся биологически активными добавками в лечебном и диетическом питании [1, 18].

В листьях оливы представлены следующие классы флавоноидов – флаваноны, группа флавоноидов, содержащих один асимметрический атом углерода; флаванолы,

содержащие два асимметрических атома углерода. Определены флавоны распространенная группа флавоноидов, имеющих, светло-желтую, желтую или желто-зеленую окраску. Также представлены изофлавоны и халконы. В следовых количествах найдены флавоноиды, характерные для листьев растений чая, теафлавины и теарубигины и большая представленность флавоноидов из группы антоцианидинов (рис. 2 и 3). Среди флавоноидов (за исключением антоцианидинов, о которых будет сказано ниже) наиболее представленным классом являются флаванолы и флаваноны, на долю которых приходится от 2,2 до 3,4% (в среднем 248,4 мг/100 г сухой массы). Остальные классы флаваноидов распределяются в листьях *Olea europaea* равномерно, составляя в среднем 35,61 мг/100 г. И только на долю флавоноидов катехиновой группы (теафлавинов и теарубигинов) приходится всего 1,99 мг/100 г сухой массы (рис. 2).

Рис. 2 Содержание флавоноидов в листьях *Olea europaea* L., мг/100 г сухой массы

Класс антоцианидинов представлен в растениях в виде гликозидов (антоцианов), наиболее часто встречается цианидин. Однако, нами определено, что в листьях оливы из антоцианов наиболее представлен пеларгонидин, количество которого составляет 184,0 мг/100 г, в то время как на цианидин приходится только 160 мг/100 г. В итоге, в ранжире по уменьшению содержания располагаются цианидин > дельфинидин > мальвидин > пеонидин-3-глюкозид (рис. 2). Содержание этих групп антоцианов в 1,2-1,3 раза меньше, чем пеларгонидина. Известно, что этот антоциан обладает антиканцерогенной активностью [17], недавние исследования, проведенные крымскими учеными, вполне могут быть связаны, в том числе, и с большим содержанием пеларгонидина в листьях оливы.

Еще одна важная в биоактивном плане группа — это каротиноиды, относящиеся к тетратерпенам и представляющие собой группу природных пигментов. Каротиноиды в растениях находятся в форме трех изомеров, наиболее распространенным из которых является β -каротин. Нами определено, что содержание каротиноидов в листьях оливы составляет в среднем от 0,37 до 0,45 мг/г сухой массы. Суммарное количество зеленых пигментов варьировало в пределах $1,75 \pm 0,09$ мг/г сухой массы.

Между содержанием антоцианов и фотосинтетическими пигментами существует закономерная связь, выражающаяся в том, что антоцианы являются элементами нефотохимической защиты фотосинтетического аппарата [2]. Так, в работах Feild et al. (2001) показано, что антоцианы предохраняют разрушенный хлорофилл от воздействия световых лучей, ограничивая формирование радикалов кислорода [13].

Учитывая, что *O. europaea* произрастает в регионах с высоким уровнем инсоляции, нам заинтересовал вопрос о том, какая связь наблюдается между

содержанием антоцианов в листьях и количеством фотосинтетических пигментов. Анализ показал, что корреляция достаточно тесная ($r = -0.75$), причем высокое содержание антоцианов сопровождается более низким количеством каротиноидов и одновременно, коррелирует с низким уровнем зеленых пигментов ($r = -0.80$) (рис. 3).

Рис. 3 Антоцианы листьев *Olea europaea* L., мг/100 г сухой массы

Помимо этого, анализ и идентификация биологически активных веществ в листьях *Olea europaea* L. продолжатся. Нами проведен анализ содержания летучих эфирных масел и в данный момент идет определение жирных кислот, как элементов-предшественников эфирных компонентов, что позволит установить особенности компонентного состава и оценить фармакологическую значимость данной культуры в условиях ЮБК.

Заключение

Таким образом, нами проведен анализ биологически активных веществ в листьях *Olea europaea* L., произрастающей в Никитском ботаническом саду (пгт Никита, Республика Крым). Предварительные исследования показали, что в листьях содержится большая группа фенольных соединений, наиболее представленная флаваноидами из класса антоцианидинов (в среднем по группам 154,5 мг/100 г сухой массы), флаванонов (197,1 мг/100 г) и флаванолов (299,7 мг/100 г). Из антоцианидинов наиболее представлена группа пеларгонидина (184,0 мг/100 г сухой массы). Высокое содержание антоцианов коррелирует с пониженным количеством фотосинтетических пигментов ($r = 0.7-0.8$).

Благодарность

Авторы выражают благодарность заведующему отделом плодовых культур, к.с.-х.н. Сергею Юрьевичу Хохлову и куратору коллекции маслины, старшему научному сотруднику лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур, к.с.-х.н. Сергею Юрьевичу Цюпке за содействие в проведении исследований

Список литературы

1. Каримов А.М., Ботиров Э.Х., Маматханов А.У., Сагдуллаев Ш.Ш. Флавоноиды растений рода *Scutellaria* L. – Ташкент: ИХРВ, НГУ Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. – 2016. – 125 с.
2. Макаревич А.М., Шутова А.Г., Спиридович Е.В., Решетников В.Н. Функции и свойства антоцианов растительного сырья // Труды Белорусского государственного университета. Серия: Физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. – 2009. – Т. 4, вып. 2. – С. 147-157.
3. Николаева Т.Н., Лапшин П.В., Загоскина Н.В. Метод определения суммарного содержания фенольных соединений в растительных экстрактах с реактивом Фолина-Дениса и реактивом Фолина-Чокальтеу: модификация и сравнение // Химия растительного сырья. – 2021. – № 2. – С. 291-299. DOI: 10.14258/jcrpm.2021028250.
4. Олива против рака: учёные КФУ провели анализ оливкового масла собственного производства, 2022. – [Электронный ресурс] – URL: <https://cfuv.ru/news/oliva-protiv-raka-uchjonye-kfu-proveli-analiz-olivkovogo-masla-sobstvennogo-proizvodstva>
5. Палий А.Е., Палий И.Н., Старцева О.В. Сравнительное исследование фенольных соединений листьев и плодов *Olea europaea* L. // Химия растительного сырья. – 2020. – № 2. – С. 141-148. DOI: 10.14258/jcrpm.2020025329
6. Палий А.Е., Палий И.Н., Федотова И.А., Мелкозерова Е.А., Цюпка С.Ю., Гребенникова О.А. Динамика фенольных соединений в листьях маслины европейской в холодный период на южном берегу Крыма // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. – 2019 – № 133. – С. 51-56. DOI: 10.36305/0513-1634-2019-133-51-56
7. Паштецкая А. В., Бакова Н. Н. Роль продуктов из листьев маслины (*Olea europaea* L.) в профилактике и лечении заболеваний: обзор // Чай в историческом, культурном и медицинском аспектах: Материалы III научно-теоретической конференции с международным участием. – Курск: Курский государственный медицинский университет. – 2022. – С. 360-379
8. Чупахина Г.Н., Масленников П.В. Методы анализа витаминов: Практикум. – Калининград: Изд-во КГУ. – 2004. – 36 с.
9. Шлык А.А. Определение хлорофилла и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев. В кн.: Биохимические методы в физиологии растений. – М.: Наука. – 1971. – С. 154-170.
10. Шолохова В.А. Каталог перспективных сортов и форм маслины коллекции Государственного Никитского ботанического сада. – Ялта. – 1973. – 35 с.
11. Шолохова В.А., Черкасова К.Д. Итоги сортоизучения маслины на Южном берегу Крыма / Итоги сортоизучения хурмы и маслины на Южном берегу Крыма // Труды Государственного Никитского ботанического сада. – Харьков. – 1970. – Т. XLVII. – 138 с.
12. Esti M., Cinquanta L., La Notte E. Phenolic compounds in different olive varieties // J. Agric.Food Chem. – 1998. – Vol. 46. – P. 32-35. DOI: 10.1007/s00217-002-0619-6.
13. Feild T.S., Lee D.W., Holbrook N.M. Why leaves turn red in autumn? The role of anthocyanins in senescing leaves of red-osier dogwood // Plant Physiology. – 2001. – Vol. 127, № 2. – P. 566-574
14. Herrero M., Temirzoda TN., Segura-Carretero A., Quirantes R., Plaza M., Ibañez E. New possibilities for the valorization of olive oil by-products // J Chromatogr A. – 2011. – Vol. 1218(42) – P. 7511-7520. – DOI: 10.1016/j.chroma.2011.04.053
15. Japón-Luján R., Luque-Rodríguez J.M., Luque de Castro M.D. Dynamic ultrasound-assisted extraction of oleuropein and related biophenols from olive leaves // J Chromatogr A. – 2006. – Vol. 1108. – P.76-82. DOI: 10.1016/j.chroma.2005.12.106

16. Kamran M., Hamlin A.S., Scott C.J., Obied H.K. Drying at high temperature for a short time maximizes the recovery of olive leaf biophenols // *Ind Crop Prod.* – 2015. – Vol. 78. – P. 29-38. DOI: 10.1016/j.indcrop.2015.10.031
17. Karthi N., Karthiga A., Kalaiyarasu Th., Stalin A., Manju V. Exploration of cell cycle regulation and modulation of the DNA methylation mechanism of pelargonidin: Insights from the molecular modeling approach // *Computational Biology and Chemistry.* – 2017. – Vol. 70. – P. 175-185. DOI: 10.1016/j.combiolchem.2017.08.002
18. Martinez L., Castillo J., Ros G., Nieto G. Antioxidant and antimicrobial activity of rosemary, pomegranate and olive extracts in fish patties // *Antioxidants.* – 2019. – № 8. DOI: 10.3390/antiox8040086
19. Martín-García B., Pimentel-Moral S., Gómez-Caravaca A.M., Arráez-Román D., Segura-Carretero A. Box-Behnken experimental design for a green extraction method of phenolic compounds from olive leaves // *Ind Crop Prod.* – 2020. – Vol. 154. DOI: 10.1016/j.indcrop.2020.112741
20. Silva S., Gomes L., Leitao F., Coelho A.V., Boas L.V. Phenolic compounds and antioxidant activity of *Olea europaea* L. fruits and leaves // *Food Science and Technology International.* – 2006. – Vol. 12. – № 5. – P. 385-396. DOI: 10.1177/1082013206070166.
21. Talhaoui N, Taamalli A, Maria Gomez-Caravaca A, Fernandez-Gutierrez A, Segura-Carretero A. Phenolic compounds in olive leaves: analytical determination, biotic and abiotic influence, and health benefits // *Food Res Int.* – 2015. – Vol. 77. – P. 92-108. DOI: 10.1016/j.foodres.2015.09.011
22. Wojcikowski K., Stevenson L., Leach D., Wohlmuth H., Gobe G. Antioxidant capacity of 55 medicinal herbs traditionally used to treat the urinary system: a comparison using a sequential three-solvent extraction process // *J Altern Complement Med.* – 2007. – Vol. 13(1). DOI: 10.1089/acm.2006.6122. PMID: 17309384
23. Zhang C., Zhang J., Xin X., Zhu S., Niu E., Wu Q., Li T., Liu D. Changes in Phytochemical Profiles and Biological Activity of Olive Leaves Treated by Two Drying Methods // *Front. Nutr.* – 2022. – Vol. 9. DOI: 10.3389/fnut.2022.854680

Статья поступила в редакцию 25.05.2023 г.

Belous O.G., Pashtetskaia A.V., Platonova N.B. Content of some biologically active substances in the leaves of *Olea europaea* L. // Bull. of the State Nikita Botan. Gard. – 2023. – № 147. – P. 49-55

Component composition of a number of biologically active substances in the leaves of *Olea europaea* L., growing on the basis of the Nikitsky Botanical Gardens was spectrophotometrically determined. The total content of polyphenols averages 538.94 mg/100 g dry weight. The main flavonoids of the leaves are anthocyanidins, flavanones (197.1 mg/100 g) and flavanols (299.7 mg/100 g). Of the anthocyanidins, pelargonidins (184.0 mg/100 g) and cyanidins (160.1 mg/100 g) are the most represented, the content of other anthocyanins is at the same level - an average of 18% of the total anthocyanins. The amount of photosynthetic pigments is 0.43 ± 0.02 mg/g (chlorophyll b), 1.32 ± 0.07 mg/g (chlorophyll a) and 0.40 ± 0.02 mg/g (total carotenoids). The content of anthocyanidins negatively correlates with the amount of chlorophylls and carotenoids. The analysis and identification of biologically active substances in the leaves of *Olea europaea* L. will continue, which will allow us to assess the pharmacological significance of this crop in the Southern Coast of the Crimea.

Key words: *Olea europaea* L.; olive; leaves; biologically active substances; flavonoids; anthocyanins; carotenoids